

Allergia főbb tünete:

- Tüsszögés, orrdugulás, orrfolyás, viszkető orr
- Szemviszketés, könnyezés, piros, duzzadt szemek
- Viszkető bőr, bőrkiütés, ekcéma, csalánkiütés
- Köhögés, asztmaszerű tünetek, viszkető torok
- Súlyos esetben anafilaxia

BŐRTÜNETEK CSILLAPÍTÁSÁRA:

- Fenistil gél:
 - napi 2-4 alkalommal, fényérzékenyít
- Supraderm gél:
 - Napi többszöri alkalmazás, nem fényérzékenyít
- Novosil gél:
 - Napi többszöri alkalmazás, 1 éves kortól

SZEMTÜNETEK CSILLAPÍTÁSÁRA

- Allergodil szemcsepp:
 - 2x1 csepp, súlyosabb esetben 4x1 csepp, 4 éves kortól
 - Tünetek megszűnéséig
 - Kontaktlencse nem viselhető, 15 perccel alkalmazás után helyezhető be
- Taleum szemcsepp
 - 3-4x2-3 csepp
 - Kontaktlencse nem viselhető az alkalmazása mellett
 - Befolyásolhatja a látóképességet
- Ocutein Allergo szemcsepp
 - Napi többszöri alkalmazás
 - Kontaktlencsével is lehet alkalmazni

Orrtünetek csillapítására:

- Allergodil orrspray:
 - 2x1-1 puff, 6 éves kortól
- Otrivin allergia
 - 3-4x1-2 puff, 6 éves kortól
- Sterimar Allergia
 - 6 éve alatt is, napi 2-6 alkalommal 1-1 befújás
- Tenger vizes orróblítás

SZÁJON ÁT SZEDHETŐ ANTIHISZTAMINOK:

- Hatásosan enyhítik a viszketést, tüsszögést, allergiás kötőhártya-gyulladást és orrfolyást.
- Cetirizin Hexal 10 mg
 - Napi 1 tabl. 12 éves kortól, 6 éves kortól 2x fél tabl., álmósíthat
 - Zyrtec csepp (korábban Cetirizin csepp) gyerkeknek: 2 év: 2x5 csepp, 6 év: 2x10 csepp, 12 év: 1x20 csepp
- Lendin Neo
 - Napi 1 szájjban diszpergálódó kékszőlő ízű tabl., 12 éves kortól, nem álmósít
- Lordestin Akut
 - Nem álmósít, napi 1 tabl., 12 éves kortól