

Beteg beleegyező nyilatkozat

Alulírott,(születési hely, idő:.....)
kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy kezelőorvosom (név:),
koronavírus fertőzést állapított meg nálam.

Kezelőorvosom széleskörűen tájékoztatott arról, hogy

- betegségem kezelésére rendelkezésre áll a favipiravir hatóanyagot tartalmazó gyógyszer, aminek a felírása azonban indikáción túli gyógyszerrendelésnek minősül tekintettel arra, hogy a Favipiravir Egis 200 mg filmtabletta nevű gyógyszer alkalmazási előírásában nem szerepel a koronavírus okozta fertőzés,
- mit jelent az indikáción túli gyógyszerrendelés,
- a rendelkezésre álló szakirodalmi adatok alapján milyen előnye, terápiás haszna és hatása lehet a Favipiravir Egis 200 mg filmtabletta nevű gyógyszerrel indikáción túl történő kezelésnek,
- a Favipiravir Egis 200 mg filmtabletta nevű gyógyszer indikáción túli alkalmazása milyen kockázatokkal, következményekkel, mellékhatásokkal járhat,
- ha mellékhatást észlelek, rövid időn belül tájékoztatom a kezelőorvost, aki eldönti, hogy folytathatom-e a kezelést.

A favipiravir magzati károsodást okozhat, ezért terhesség alatt tilos alkalmazni. A favipiravir bekerül az anyatejbe, ezért szedésekor a szoptatást fel kell függeszteni. Fogamzóképes nő és szexuálisan aktív férfi kizárólag akkor szedheti a gyógyszert, ha hatékony fogamzásgátlást alkalmaz a gyógyszereszedés alatt és utána még 7 napig.

Minden vonatkozó négyzetet be kell jelölnie és a nyilatkozatot Önnek és a gyógyszert elrendelő orvosnak alá kell írnia.

Fogamzóképes korú nők töltik ki!	
Megbeszéltem a kezelőorvosommal és megértettem az alábbiakat:	
miért szükséges favipiravir tartalmú gyógyszert szednem	<input type="checkbox"/>
a favipiravir ártalmatlan a magzat és a születendő gyermek számára	<input type="checkbox"/>
a favipiravir nem alkalmazható ismert vagy gyanított várandósság esetén	<input type="checkbox"/>
terhességi tesztet kell végezni a kezelés megkezdése előtt	<input type="checkbox"/>
hatékony fogamzásgátló módszert kell alkalmazni a favipiravir kezelés során és azt követően 7 napig	<input type="checkbox"/>
a hatékony fogamzásgátlás lehetőségei	<input type="checkbox"/>
várandósság gyanúja esetén azonnal abba kell hagyni a favipiravir szedését és orvoshoz kell fordulni	<input type="checkbox"/>
a készítményt nem adhatom át másnak	<input type="checkbox"/>

Férfiak töltik ki!	
Megbeszéltem a kezelőorvosommal és megértettem az alábbiakat:	
miért szükséges favipiravir tartalmú gyógyszert szednem	<input type="checkbox"/>
a favipiravir bejut az ondófolyadékba (spermába)	<input type="checkbox"/>
a favipiravir ártalmas a magzat és a születendő gyermek számára	<input type="checkbox"/>
hatékony fogamzásgátló módszert (óvszert) kell alkalmaznom a favipiravir-kezelés során és azt követően 7 napig	<input type="checkbox"/>
várandós nővel nem léphetek szexuális kapcsolatba	<input type="checkbox"/>
a készítményt nem adhatom át másnak	<input type="checkbox"/>

A fenti tájékoztatást követően önként, befolyástól mentesen hozzájárulok a Favipiravir Egis 200 mg filmtabletta nevű gyógyszer indikáción túli alkalmazásához. Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor, szóban vagy írásban, indokolás nélkül visszavonhatom.

.....
Beteg neve

.....
Beteg aláírása

.....
Dátum

.....
Kezelőorvos neve

.....
Kezelőorvos aláírása, pecsétje

.....
Dátum