



Aki vért ad, életet ad

„Találd meg magadban a hőst, és adj vért”
(Országos Vérellátó Szolgálat)



Miért adj vért?



- Sok betegnek szüksége van vérre a gyógyuláshoz,
- ha egészséges vagy, neked nem árt,
- némi ráfordítással (idő, bátorság) segíthetsz másokon,
- nincs olyan orvosi eljárás, amivel pótolható lenne a vér, ha szükség van rá.

Miért jó vért adni?



- Véradás előtt megvizsgálják,
- laboratóriumi szűrővizsgálatok készülnek,
- ha valamilyen betegség kiderül, megfelelő helyre beutálnak további vizsgálatokra és kezelésre,
- megtudhatod a vércsoportodat,
- jó példát mutathatsz a fiatalabbaknak.

Mikor van szükség vérre?



- Nagy vérveszteséggel járó, súlyos baleseteknél:
 - közlekedési, munkahelyi, háztartási.
- Nagy műtéteknél:
 - nyitott szívműtét, máj-, szív és tüdő transzplantáció, csípőprotézis beültetés, problémás, szövődményes nőgyógyászati-, szülészeti műtéteknél.

Kinek van szüksége vérrre?



- Daganatos betegeknek,
- vérképzőszervi betegeknek,
- koraszülötteknek, újszülötteknek életmentő műtétek kapcsán,
- szülő nőknek szövődmenyes szülés során vagy után.

Ki adhat vért?



Mindenki, aki

- 18-65 év között van,
- testsúlya meghaladja az 50 kg-ot,
- vérnyomása 110/60 - 180/100 között van,
- nincs súlyosabb krónikus betegsége,
- aktuálisan nem beteg (pl.: meghűlés, sebesülés. stb.),
- a megelőző fél évben nem volt fertőzésveszélynek kitéve illetve fertőző betegsége,
- nem szenvedélybeteg, nem használ drogot.

Ki nem adhat vért?



Akinek

- rosszindulatú daganatos betegsége van vagy volt korábban,
- vérképzőszervi betegsége van vagy volt korábban,
- autoimmun betegsége van,
- rendszerbetegsége van,
- inzulinos cukorbeteg,

Ki nem adhat vért?



Akinek

- szívinfarktuson, bypass műtéten esett át,
- súlyos légzőszervi betegsége van (asztma, COPD)
- agyvérzése, agyi keringési zavara, érbetegsége volt vagy van,
- lépét vagy egyik veséjét eltávolították,
- pszichiátriai betegségben szenved.

Mikor nem lehet vért adni?



- Műtétek után a teljes gyógyulásig,
- terhesség alatt és szülés után fél évig,
- szoptatás befejezése után 3 hónapig,
- fertőző betegségek után változó ideig,
- trópusi utazások után a célország járványügyi helyzetétől függően változó ideig,
- bizonyos gyógyszerek szedése alatt illetve utána 3 évig:
Lariam, Delagil, Roaccutan, Psoralen,
- kivizsgálatlan panaszok, betegségre utaló tünetek esetén.

Összeállította: Dr. Tomonkó Magdolna

Copyright 2015. Dr. Hope Humán Service Kft.

